COMUNE di OLTRESSENDA ALTA **DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCATE**

Particella n°	Località
4	Croce
Classe colturale	fustaia
Classe attitudinale	produzione
Classe economica	A
Ordinam. vegetaz.	pecceta montana

SUPERFICIE ha	
Totale Lorda	4,87
Improduttiva	0,00
Produttiva non forestale	0,00
Produttiva forestale	4,87

Notizie Piano Precedente		
Superficie Produttiva ha		
Utilizzazioni	previste	effettuate
Fustaia mc		
Ceduo mc		
Classi di Accessibilità		
I	II	III
2,5	2,37	

Note

FUSTAIA

Anno rilievi Modalità	Fertilità	Età media	Densità media	AREA BASIMETRICA Ad ha	AREA BASIMETRICA Totale	Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	Piante ad ha	PROVVIGIONE Norm. Ad ha	PROVVIGIONE Reale Ad ha	PROVVIGIONE Reale Totale	INCREMENTO MEDIO mc Ad ha	INCREMENTO MEDIO mc Totale	INCREMENTO CORRENTE mc Ad ha	INCREMENTO CORRENTE mc Totale	INCREMENTO CORRENTE %
2009	classe	anni		mq	mq	m	m	cm	mc	n°	mc	mc	mc	mc	mc	mc	mc	
relasc.	VI		0,65	17,14	92,4	21,5	27	32	0,7	236		165	889			3,85	18,75	2,11

COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO

	Specie legnosa	tariffa cubat.	Piccole (20-30 cm) n.piante	Piccole massa	Piccole %	Medie (35-45 cm) n.piante	Medie massa	Medie %	Grosse (50 cm e +) n.piante	Grosse massa	Grosse %	TOTALI n. piante	TOTALI massa	TOTALI %
RILIEVI ATTUALI	Abete rosso											873	731	82,2
	Abete bianco											86	71	8,0
	Larice											0	0	0,0
	Latifoglie											314	87	9,8
	TOTALI											**1273**	**889**	**100**
RILIEVI PRECEDENTI														
	TOTALI													

CEDUO

Anno rilievi Modalità	Fertilità	Età media	Densità media	AREA BASIMETRICA Ad ha	AREA BASIMETRICA Totale	Altezza media	Diametro medio polloni	Rapporto n° polloni/cepp.	Polloni per ha	Ceppaie per ha	Matricine per ha	Allievi in conv. per ha	PROVVIGIONE mc per ha	PROVVIGIONE mc totale	increm. medio mc/ha ceduo	increm. medio mc/ha matric	increm. medio totale mc
2000	classe	anni		mq	mq	m	cm		n°	n°	n°	n°					

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO								CLASSI CRONOLOGICHE (anni dal taglio) ettari										
Carpino	Querce	Casta-gno	Robinia	Faggio	Latif. nobili	Specie igrofile	Specie second.	1		-10		-20		-30		-40		TOT.