

NOTE SULLA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI

F	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				
												normale m³	reale m³	medio m³		corrente m³		%	
					ad ha	Totale								ad ha	Totale	ad ha	Totale		ad ha
	2001	VII	85	0,8				25				208	162	2786	1,9	32,8	3,4	58,5	2,1

Per le fustaie il dato provvigionale esprime la massa cormometrica degli alberi con D>17,5 cm (sia di conifere che di latifoglie). Non comprende invece il volume delle classi 0 e 00 rilevate con campionamento relascopico.

Per le fustaie la densità media è ottenuta dal rapporto fra provvigione reale e provvigione normale, sia che i dati provvigionali siano stati stimati o rilevati con metodi analitici.

S	SPECIE LEGNOSA	Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%
			N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	
T														
A  I  A	ABETE ROSSO											2.396	86%	
	LARICE											167	6%	
	ABETE BIANCO											11	0%	
	PINO SILVESTRE											28	1%	
	FAGGIO											195	7%	
	ALTRE LATIFOGIE												0%	
TOTALI												2.798	100%	

La composizione percentuale delle diverse specie indicata in questo riquadro, è riferita alla massa cormometrica delle piante con D>17,5cm sia per le conifere che per le latifoglie.

C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %					
							ad ha		totale									
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Querce	Castagno	Faggio	Latifoglie pregiate	Sp. Secondarie
	2.001	b	2	0,5			1	11	10	196	6,0	108,4	2		1	90	7	

Per i boschi cedui la provvigione è riferita alla massa dendrometrica delle piante con D > 3 cm sia per i polloni che per le matricine, con stima effettuata per confronto co i rilievi campionari.

Per i boschi cedui la densità media, indicata in questo riquadro, esprime il grado di copertura esercitato dalle chiome di polloni e matricine.

Per i boschi cedui, la composizione percentuale delle diverse specie forestali è espressa in funzione del grado di copertura.

DESCRIZIONE PARTICELLARE

Terreno nel complesso ripido e a scarsa accidentalità, pendenze inferiori verso il confine con la particella 14. Nella parte centrale cava di pietra abbandonata e verso il basso abbondante pietrosità e accidentalità. Matrice pedogenetica di tipo carbonatico. Humus di tipo mull, suolo bruno calcareo discretamente profondo e moderatamente fresco, fuorché verso il centro, caratterizzato da terreno sciolto e a scheletro prevalente.

Piceo-faggeto dei substrati carbonatici variante dei suoli xerici a prevalenza di abete rosso (75%), faggio (20%) poco larice (4%) e sporadico pino silvestre. Buona partecipazione del faggio da ceppaia su tutta la fascia centrale. Recente utilizzazione di quest'ultimo con abbondante rilascio di polloni di buon portamento, tali da consentire la progressiva affermazione di una fustaia mista di conifere e latifoglie. Verso il confine con la particella 14 e a tratti verso la 10, fustaia di abete rosso adulta e matura con buona densità, intercalati da piccoli gruppi di giovane fustaia e perticaia a densità eccessiva. Buca da taglio a raso nella parte bassa sopra la strada per la cava, colonizzata da abbondante nocciolo e rovi. Portamento e sviluppo dell'abete rosso e del larice in genere discreti. Altre latifoglie: tiglio, acero di monte, frassino maggiore, orniello.

Rinnovazione scarsa e diffusa sotto copertura. Novellame intristito e gravemente compromesso.

Strato arbustivo abbondante in basso e verso la particella 10 costituito da nocciolo, rovi, faggio, rosa canina, lo Strato erbaceo a Hepatica nobilis, Paris quadrifolia, Aposeris foetida, Prenanthes purpurea, Veronica urticifolia.

All'interno di ciascuna descrizione particellare, sia per le fustaie che per i cedui, è contenuta una stima oculare della composizione del popolamento, espressa come grado di copertura delle chiome delle diverse specie forestali.

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Roncaie		PARTICELLA N°		1		
	PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE				
Altitudine m s.l.m.: min. 1.250 max. 1.599 prevalente 1.420  Giacitura: medio-alto versante Esposizione: Nord  Terreno inclinato, con pendenza circa del 40 %. Accidentalità moderata per diffusa rocciosità affiorante. Matrice pedogenetica di tipo calcareo. Humus di tipo moder, fresco. Pecceta secondaria montana, disetanea a gruppi, composta da abete rosso (60%), faggio (25%) e larice (15%) Nella parte bassa è presente una notevole mescolanza tra specie in gruppi; il faggio, di prevalentemente origine agamica, è nel piano dominato con tendenza naturale all'alto fusto. Nella parte superiore Piceo-faggeto dei substrati carbonatici con maggiore partecipazione del faggio, anche nel piano dominante. Il portamento dell'abete rosso è buono con densità regolare, a tratti lacunosa. Rinnovazione di abete rosso buona nelle chiarie, ma poco vigorosa. Stato vegetativo nel complesso sufficiente, chioma a volte rada; incrementi ipsometrici rilevanti per le classi giovani, ridotti per quelle mature. Strato arbustivo: faggio, rosa canina, lonicera, rovo, sorbo degli uccellatori, crespino, salicone, nocciolo, Sorbus aria, Rhododendron hirsutum, ginepro, acero e biancospino. Strato erbaceo: graminacee e ericacee (Erica carnea), Polygala chamaebuxus, Helleborus niger, Vaccinium myrtillus, Daphne mezereum, Gentiana asclepiadea, Cyclamens purpurascens.							
		Fustaia				accessibilità	3
						cod. trattamento	103
		Volume cormometrico lordc m³				670	
		Volume cormometrico m³/ha				35	
		Volume netto presunto m³				460	
		Tasso di utilizzazione %				14%	
		Anno o periodo di intervento				III	
		Massa intercalare				accessibilità	3
						codice intervento	141/171
		Volume cormometrico lordc m³				240	
		Anno o periodo di intervento				I	
		Ceduo				accessibilità	
						cod. trattamento	
		Ripresa planimetrica ha					
Volume dendrometrico m³							
Anno intervento							
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità		
	1. Dirado selettivo dei gruppi di perticaia e giovane fustaia a densità accessiva nella parte alta e bassa della particella. 2. Taglio di conversione all'alto fusto delle compagini a ceduo di faggio con rilascio dei migliori polloni per ogni ceppaia (1-2).						
OSSERVAZIONI	141/171	U.	3	ha	6		

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Roncaie</b>	PARTICELLA N° <b>2</b>				
	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio raso a buche o piccole strisce, <1000 mq, nei tratti coetaneiformi a densità eccessiva, finalizzati all'articolazione della struttura e all'insediamento della rinnovazione. 2. Taglio di conversione all'alto fusto delle compagini a ceduo di faggio con rilascio dei migliori polloni per ogni ceppaia (1-2).	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	2	
Volume cormometrico lordc m³						
	cod. trattamento			103		
	Volume cormometrico m³/ha		37			
Volume netto presunto m³	280					
Tasso di utilizzazione %	14%					
Anno o periodo di intervento	III					
Massa intercalare	accessibilità		1			
	codice intervento		141/171			
Volume cormometrico lordc m³	160					
Anno o periodo di intervento	I					
Ceduo	accessibilità					
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE  1. Dirado selettivo dei gruppi di perticaia e giovane fustaia a densità accessiva nella parte alta e bassa della particella. 2. Taglio di conversione all'alto fusto delle compagini a ceduo di faggio con rilascio dei migliori polloni per ogni ceppaia (1-2).	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
	141/171	U.	1	ha	4	

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Chigozzo</b>		PARTICELLA		N°	<b>3</b>
	PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	3
Altitudine m s.l.m.: min. 1.270 max. 1.600 prevalente 1.450  Giacitura: medio-alto versante Esposizione: Sud-ovest   Terreno scosceso. Accidentalità elevata per rocciosità e pietrosità diffusa. Matrice pedogenetica di tipo calcareo. Humus di tipo moder, fresco. Piceo-faggeto dei substrati carbonatici, disetaneo a gruppi, composto da abete rosso (45%), faggio (50%) e larice (5%); faggio prevalentemente relegato allo stato arbustivo. Strato arbustivo: faggio, rosa canina, lonicera, rovo, sorbo degli uccellatori, crespino, salicone, nocciolo, sorbus aria, Rododendrum insuitum, ginepro, acero e biancospino. Strato erbaceo: graminacee e ericacee (Erica carnea), polygala chamaebuxus, Helleborus niger, Vaccinium myrtillus, Daphne mezereum, Gentiana asclepiadea, Cyclamens purpurascens.						
		cod. trattamento			122	
		Volume cormometrico lordc m³		<b>40</b>		
		Volume cormometrico m³/ha		<b>5</b>		
		Volume netto presunto m³		25		
		Tasso di utilizzazione %		<b>10%</b>		
		Anno o periodo di intervento		<b>II</b>		
		Massa intercalare		accessibilità		
				codice intervento		
		Volume cormometrico lordc m³				
		Anno o periodo di intervento				
		Ceduo		accessibilità		
				cod. trattamento		
		Ripresa planimetrica ha				
		Volume dendrometrico m³				
		Anno intervento				
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

[illegible]



DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Chigozzo</b>		PARTICELLA N°		<b>4</b>		
	Altitudine m s.l.m.: min. 1.100 max. 1.250 prevalente 1.161 Giacitura: medio versante Esposizione: Ovest  Terreno ripido. Accidentalità moderata per pietrosità superficiale. Matrice pedogenetica di tipo calcareo. Humus di tipo moder. Piceo-faggeto dei substrati carbonatici, disetaneo a gruppi, composto da abete rosso (70%), faggio(25%), larice e abete bianco (5%). Il portamento dell'abete rosso è buono con densità regolare. Il faggio è per lo più di origine agamica. Rinnovazione di abete rosso sotto copertura. Strato arbustivo: faggio, rosa canina, lonicera, rovo, sorbo degli uccellatori, crespino, nocciolo, Sorbus aria, ginepro, acero e biancospino. Strato erbaceo: graminacee e ericacee (Erica carnea), Polygala chamaebuxus, Helleborus niger, Vaccinium myrtillus, Daphne mezereum, Gentiana asclepiadea, Cyclamens purpurascens.		PIANO DEI TAGLI  1.Taglio successivo a gruppi in assistenza ai nuclei di rinnovazione presente. 2. Dirado selettivo dei gruppi di perticaia e giovane fustaia a densità accessiva.		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità
		cod. trattamento	122				
		Volume cormometrico lordc m³	<b>160</b>				
		Volume cormometrico m³/ha	<b>13</b>				
		Volume netto presunto m³	110				
		Tasso di utilizzazione %	<b>8%</b>				
		Anno o periodo di intervento <b>II</b>					
		Massa intercalare	accessibilità	2			
			codice intervento	141			
		Volume cormometrico lordc m³	<b>66</b>				
		Anno o periodo di intervento <b>II</b>					
		Ceduo	accessibilità				
			cod. trattamento				
		Ripresa planimetrica ha					
		Volume dendrometrico m³					
		Anno intervento					
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE  1. Dirado selettivo dei gruppi di perticaia e giovane fustaia a densità accessiva.		Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
			141	P.U.	2	ha	2

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Chigozzo</b>	PARTICELLA N°				<b>5</b>
	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio successivo a gruppi in assistenza ai nuclei di rinnovazione presente. 2. Dirado selettivo dei gruppi di perticaia e giovane fustaia a densità accessiva.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		3
cod. trattamento				122		
Volume cormometrico lordc			m³	<b>40</b>		
Volume cormometrico			m³/ha	<b>7</b>		
Volume netto presunto			m³	25		
Tasso di utilizzazione			%	<b>5%</b>		
Anno o periodo di intervento			<b>II</b>			
Massa intercalare			accessibilità		2	
			codice intervento		141	
Volume cormometrico lordc			m³	<b>24</b>		
Anno o periodo di intervento			<b>III</b>			
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico			m³			
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE  1. Dirado selettivo dei gruppi di perticaia e giovane fustaia a densità accessiva.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	N.U.	2	ha	1

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate												PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																								
N° PART.	LOCALITA'			F	U	S	T	A	I	A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO															
6	Cugol														BASIMETRICA m²							normale m³		reale m³		medio m³		corrente m³		%										
CLASSE COLTURALE		ceduo													ad ha	Totale						ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale												
CLASSE ATTITUDINALE		produzione																																						
CLASSE ECONOMICA		O													1905	VI						100	0,3				26			225	40	288	0,4	2,9	0,4	2,9	1,0%			
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:															1988	0							0,0				0			0,0			0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<div>Orno-ostrieto tipico</div> <div>SUPERFICIE TOTALE LORDA07.32.80</div> <div>SUPERFICIE IMPRODUTTIVA0.12.80</div> <div>SUP. PROD. NON FORESTALE0.0.0</div> <div>SUP. PROD. FORESTALE07.20.00</div> <div>Notizie piano precedente</div> <div>Superficie produttiva ha04.00.00</div> <div>UTILIZZAZIONI<div>PrevisteEffettuate</div></div> <div>FUSTAIA m³00</div> <div>CEDUO m³</div> <div>Classi di accessibilità ha<div>I0.54.53</div><div>II06.54.81</div><div>III0.23.46</div></div> <div>Note:</div>															COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																									
															FUSTAIA																									
															SPECIE LEGNOSA							Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%						
																							N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³							
				ABETE ROSSO		VI														288	100,0%																			
				LARICE		VI															0,0%																			
				ABETE BIANCO		VI															0,0%																			
				PINO SILVESTRE		VI															0,0%																			
				FAGGIO		VI															0,0%																			
ALTRE LATIFOGLIE		VI															0,0%																							
TOTALI																	288	100,0%																						
rilevi prec.		ABETE ROSSO	0															0,0%																						
		LARICE	0															0,0%																						
		ABETE BIANCO	0															0,0%																						
		PINO SILVESTRE	0															0,0%																						
		FAGGIO	0															0,0%																						
		ALTRE LATIFOGLIE	0															0,0%																						
TOTALI																		0,0%																						
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³	COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																												
							ad ha		totale																															
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Sp. Secondarie																						
					2012	M	45	0,8	36,0	233,3	153	17	991	110	3,8	24,5	55	2			25	5	13																	
	1988	9	30,0	0,7								60	15	15			10																							

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Cugol</b>		PARTICELLA		N°	<b>6</b>
	PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	
Altitudine m s.l.m.: min. 1.050      max. 1.200      prevalente 1.100  Giacitura:              medio versante              Esposizione: Sud   Terreno ripido. Accidentalità elevata per rocciosità e pietrosità superficiale. Matrice pedogenetica di tipo calcareo. Humus di tipo moder. Suolo superficiale, scarsa freschezza. Orno-ostrieto tipico, composto da carpino nero (55%), faggio (25%), castagno, orniello (20%), con esemplari di abete rosso. Ceduo invecchiato di carpino nero e orniello, caratterizzato da statura e accrescimenti bassi, dovuti alla superficialità del suolo. Distribuzione verticale monoplana. Buona copertura e densità. Presenza di soggetti contorti. Buono stato fitosanitario. Nella parte alta della particella, verso il confine con la part.7, maggiore partecipazione del faggio (Faggeta montana dei substrati carbonatici) e dell'abete rosso. Strato arbustivo: nocciolo, rovo. Strato erbaceo a graminacee, con ericacee, Vinca minor, Cyclamen purpurascens, Hepatica nobilis.						
		cod. trattamento				
		Volume cormometrico lordc      m³				
		Volume cormometrico      m³/ha				
		Volume netto presunto      m³				
		Tasso di utilizzazione      %				
		Anno o periodo di intervento				
		Massa intercalare		accessibilità		
				codice intervento		
		Volume cormometrico lordc      m³				
		Anno o periodo di intervento				
		Ceduo		accessibilità	2	
				cod. trattamento	155	
		Ripresa planimetrica      ha		<b>05.76.00</b>		
		Volume dendrometrico      m³		<b>705</b>		
		Anno intervento				
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

N° PART.		LOCALITA'		F U S T A I A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO					%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	Cugol	CLASSE COLTURALE	ceduo						CLASSE ATTITUDINALE	produzione						CLASSE ECONOMICA	O	ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:	Orno-ostrieto tipico	SUPERFICIE TOTALE LORDA	14.44.74	SUPERFICIE IMPRODUTTIVA	0.04.74		SUP. PROD. NON FORESTALE	0.0.0	SUP. PROD. FORESTALE	14.40.00	Notizie piano precedente	Superficie produttiva ha	08.50.00	UTILIZZAZIONI	Previste	Effettuate	FUSTAIA m³	0	0	CEDUO m³			Classi di accessibilità ha	I	0.0.0	II	07.05.66	III	07.39.08	Note: .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																	normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <div>Cugol</div>	PARTICELLA <div>N°</div>				7
	PIANO DEI TAGLI <div>1.Taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto, con rilascio minimo di 260-280 matricine ad ettaro .</div>	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		3	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica			ha	10.08.00		
Volume dendrometrico		m³	1.097			
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																																		
N° PART.	LOCALITA'			F U S T A I A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO																													
8	Piazza Foiet								BASIMETRICA m²							normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³		%																									
CLASSE COLTURALE			ceduo						ad ha	Totale							ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale																								
CLASSE ATTITUDINALE			produzione																																													
CLASSE ECONOMICA			O																																													
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:									2012	VII						80	0,2				24					192	15	228	0,2	2,9	0,2	2,3	1,0%															
																																		1988	0		0,0				0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Piazza Foiet</b>	PARTICELLA N°				<b>8</b>
	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto, con rilascio minimo di 260-280 matricine ad ettaro .	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica			ha	<b>04.56.00</b>		
Volume dendrometrico			m³	<b>312</b>		
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Poia		PARTICELLA N°		9
	PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità
Altitudine m s.l.m.: min. 980 max. 1.230 prevalente 1.100  Giacitura: medio versante Esposizione: Ovest  Terreno ripido. Accidentalità moderata per rocciosità e pietrosità diffusa. Matrice pedogenetica di tipo calcareo. Humus di tipo moder. Suolo mediamente profondo, fresco. Pecceta secondaria montana, composta da abete rosso (98%), abete bianco e larice (2%); presenza di faggio e acero di monte nella porzione Nord-est della particella. Nella parte bassa presenza di ceduo di nocciolo e carpino nero. Struttura monoplana con tessitura grossolana; densità regolare e colma. Il portamento dell'abete rosso è buono; la rinnovazione di abete rosso è scarsa sotto copertura e presente nelle chiarie. Nella parte medio-bassa della particella presenza di piante di picea affette da bostrico e schianti. Strato arbustivo: rovo, sorbo degli uccellatori, Ionicera. Strato erbaceo poco presente, costituito in prevalenza da specie nemorali (Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea, Dentaria enneaphyllos, Pulmonaria officinalis) e felci.					
		cod. trattamento			103
		Volume cormometrico lordc m³		1.200	
		Volume cormometrico m³/ha		98	
		Volume netto presunto m³		840	
		Tasso di utilizzazione %		25%	
		Anno o periodo di intervento		I	
		Massa intercalare		accessibilità	1
				codice intervento	141/171
		Volume cormometrico lordc m³		100	
		Anno o periodo di intervento		III	
		Ceduo		accessibilità	
				cod. trattamento	
		Ripresa planimetrica ha			
Volume dendrometrico m³					
Anno intervento					
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
	131	U.	1	ha	1
	141/171	N.U.	1	ha	3
OSSERVAZIONI					

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <div>Poia</div>		PARTICELLA		N°	10				
	PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE							
1.Taglio raso a buche o piccole strisce, <1000 mq, nei tratti coetaneiformi a densità eccessiva, finalizzati all'articolazione della struttura e all'insediamento della rinnovazione. 2. Sul fondovalle della valle di Poia taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto.		Fustaia					accessibilità		2	
							cod. trattamento		103	
		Volume cormometrico lordc					m³	200		
		Volume cormometrico					m³/ha	31		
		Volume netto presunto					m³	140		
		Tasso di utilizzazione					%	25%		
		Anno o periodo di intervento					I			
		Massa intercalare					accessibilità		2	
							codice intervento		141/171	
		Volume cormometrico lordc					m³	100		
		Anno o periodo di intervento					III			
		Ceduo					accessibilità		2	
							cod. trattamento		155	
		Ripresa planimetrica					ha	01.30.00		
		Volume dendrometrico					m³	37		
Anno intervento										
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE		Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità			
			141/171	N.U.	2	ha	3			

## Frazionisti di Mazzunno

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

**PROPRIETA':** Frazionisti di Mazzunno

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Dossi</b>	PARTICELLA N°				<b>11</b>
	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto, con rilascio minimo di 260-280 matricine ad ettaro .	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità		1	
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica			ha	<b>07.85.00</b>		
Volume dendrometrico		m³	<b>879</b>			
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE  1. Potatura di risanamento, rimonda del secco da eseguirsi sugli esemplari di castagno da frutto presenti nella parte inferiore della particella. Contestuale sgombero del ceduo nelle aree prospicienti.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		281/313	U.	1	ha	2

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																															
N° PART.	LOCALITA'			F	U	S	T	A	I	A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO																				
12	Dossi														normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³		%																			
CLASSE COLTURALE			ceduo													ad ha						ad ha	Totale	ad ha	Totale		ad ha	Totale																	
CLASSE ATTITUDINALE			protezione																																										
CLASSE ECONOMICA			Y												2012	X						90					0				0													0,0%	
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:			1988												0							0,0					0				0			0,0				0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Orno-ostrieto primitivo di rupe			COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																										
			FUSTAIA																																										
SUPERFICIE TOTALE LORDA		19.22.71													SPECIE LEGNOSA	Tariffa						Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%												
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.22.71																				N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³													
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.0																																											
SUP. PROD. FORESTALE		19.00.00													rilievi attuali	ABETE ROSSO						X																					0,0%		
Notizie piano precedente																LARICE						X																					0,0%		
																ABETE BIANCO						X																			0,0%				
																PINO SILVESTRE						X																					0,0%		
																FAGGIO						X																					0,0%		
CEDUO m³																ALTRE LATIFOGLIE						X																				0,0%			
				TOTALI																							0,0%																		
Classi di accessibilità ha		I	03.60.31	rilievi prec.	ABETE ROSSO		0																					0,0%																	
		II	07.42.99		LARICE		0																				0,0%																		
		III	08.19.41		ABETE BIANCO		0																				0,0%																		
Note: .			PINO SILVESTRE		0																					0,0%																			
			FAGGIO		0																					0,0%																			
			ALTRE LATIFOGLIE		0																						0,0%																		
			TOTALI																								0,0%																		
C																																													
E	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																																
ad ha							totale																																						
D					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Sp. Secondarie																											
U	2012	S	45	0,4			50		950		1,1	21,1	85		5			10																											
O	1988	9											70					22																											



DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <div>Dossi</div>	PARTICELLA N°				12
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico			m³			
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																			
N° PART.	LOCALITA'			F  U  S  T  A  I  A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO														
13	Croden								BASIMETRICA m²							normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³		%										
CLASSE COLTURALE		ceduo							ad ha	Totale							ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale									
CLASSE ATTITUDINALE		produzione																															
CLASSE ECONOMICA		O																															
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:  Orno-ostrieto tipico																																	
SUPERFICIE TOTALE LORDA		20.01.32																															
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.21.32																															
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.0																															
SUP. PROD. FORESTALE		19.80.00																															
Notizie piano precedente																																	
Superficie produttiva ha		13.00.00																															
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate																														
FUSTAIA m³		0	0																														
CEDUO m³		300	1.000																														
Classi di accessibilità ha		I	05.05.91																														
		II	12.95.96																														
		III	01.99.45																														
Note:  .																																	
C	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)						Densità media	Area basimetrica m²						Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %											
E																ad ha		totale															
D										ad ha						Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Omiiello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate		Sp. Secondarie				
U										2012						S	18	0,8	22,0	435,6	66	44	1.307	871	6,1	121,0	63		5	5			27
O										1988						9	25,0	0,6									95						5

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <div>Croden</div>	PARTICELLA <div>N°</div>				13
	PIANO DEI TAGLI <div>1.Taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto, con rilascio minimo di 260-280 matricine ad ettaro .</div>	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc <div>m³</div>						
Volume cormometrico <div>m³/ha</div>						
Volume netto presunto <div>m³</div>						
Tasso di utilizzazione <div>%</div>						
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc <div>m³</div>						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica <div>ha</div>			07.92.00			
Volume dendrometrico <div>m³</div>			697			
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE			Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura
OSSERVAZIONI						

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																																
N° PART.	LOCALITA'			F	U	S	T	A	I	A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO																					
14	Dezzo														BASIMETRICA m²							normale m³		reale m³		medio m³		corrente m³		%																
CLASSE COLTURALE		ceduo													ad ha	Totale						ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale																		
CLASSE ATTITUDINALE		protezione																																												
CLASSE ECONOMICA		Y													2012	X						70					0				0													0,0%		
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:															1988	0							0,0				0				0,0				0			0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
<i>Orno-ostrieto primitivo di rupe</i>															COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																															
															FUSTAIA																															
SUPERFICIE TOTALE LORDA		19.74.40													rilievi attuali								SPECIE LEGNOSA	Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%										
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.74.40																							N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³											
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.0																																												
SUP. PROD. FORESTALE		19.00.00																					ABETE ROSSO		X																					0,0%
Notizie piano precedente																							LARICE		X																					0,0%
				ABETE BIANCO		X																							0,0%																	
Superficie produttiva ha		05.00.00		PINO SILVESTRE		X																								0,0%																
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate	FAGGIO		X																								0,0%																
FUSTAIA m³		0	0	ALTRE LATIFOGIE		X																								0,0%																
CEDUO m³				TOTALI																										0,0%																
Classi di accessibilità ha		I	07.49.51	rilievi prec.			ABETE ROSSO		0																			0,0%																		
		II	12.11.80				LARICE		0																			0,0%																		
III	0.13.09	ABETE BIANCO					0																				0,0%																			
		PINO SILVESTRE					0																				0,0%																			
		FAGGIO					0																					0,0%																		
		ALTRE LATIFOGIE					0																						0,0%																	
				TOTALI																						0,0%																				
Note: .	C	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																																
	ad ha							totale																																						
	U					2012	S	35	0,4			60		1.140		1,7	32,6	70	3		2		5	20																						
																									ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Omiiello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Sp. Secondarie								
O	1988	9												80						20																										

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Dezzo</b>		PARTICELLA N°		<b>14</b>	
	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto nelle aree più accessibili.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica			ha	<b>03.80.00</b>		
Volume dendrometrico			m³	<b>182</b>		
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																															
N° PART.	LOCALITA'			F U S T A I A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO																										
15	Pramele								BASIMETRICA m²							normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³		%																						
CLASSE COLTURALE		ceduo							ad ha	Totale						ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale																							
CLASSE ATTITUDINALE		produzione																																											
CLASSE ECONOMICA		O																																											
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:									2012	VII						90	0,6				24					192	95	827	1,1	9,2	1,1	9,9	1,2%												
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																													
FUSTAIA																																													
SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)																															Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%			
			N°																															m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%		N°	m³	
ABETE ROSSO		VII																																										455	55,0%
LARICE		VII																																											0,0%
ABETE BIANCO		VII																																											0,0%
PINO SILVESTRE		VII																																											0,0%
FAGGIO		VII																																										289	35,0%
ALTRE LATIFOGIE		VII																																										83	10,0%
TOTALI																																												827	100,0%
rilievi prec.		ABETE ROSSO	0																																0,0%										
		LARICE	0																																0,0%										
		ABETE BIANCO	0																																0,0%										
		PINO SILVESTRE	0																																0,0%										
		FAGGIO	0																																0,0%										
		ALTRE LATIFOGIE	0												0,0%																														
		TOTALI													0,0%																														
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³			Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																																	
							ad ha		totale																																				
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate		Sp. Secondarie																										
	U	2012	M	40	0,8			153	17	799	89	4,3	22,2	65	2	2	5		5	21																									
	O	1988	9	45,0	0,6									80						20																									

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Pramele</b>	PARTICELLA N°				<b>15</b>
	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto, con rilascio minimo di 260-280 matricine ad ettaro .	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica			ha	<b>03.48.00</b>		
Volume dendrometrico			m³	<b>284</b>		
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																									
N° PART.	LOCALITA'			F	U	S	T	A	I	A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO														
16	Ach														BASIMETRICA m²							normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³		%										
CLASSE COLTURALE			ceduo												ad ha	Totale							ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale									
CLASSE ATTITUDINALE			produzione																																				
CLASSE ECONOMICA			O												2012	VII						95	0,6				24				192	120	1596	1,3	16,8	1,4	19,2	1,2%	
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:															1988	0							0,0				0			0,0		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<div>Orno-ostrieto tipico</div> <div>SUPERFICIE TOTALE LORDA13.33.24</div> <div>SUPERFICIE IMPRODUTTIVA0.03.24</div> <div>SUP. PROD. NON FORESTALE0.0.0</div> <div>SUP. PROD. FORESTALE13.30.00</div> <div>Notizie piano precedente</div> <div>Superficie produttiva ha15.00.00</div> <div>UTILIZZAZIONI<div>PrevisteEffettuate</div></div> <div>FUSTAIA m³00</div> <div>CEDUO m³7.500</div> <div>Classi di accessibilità ha<div>I0.97.33</div><div>II10.39.84</div><div>III01.96.07</div></div> <div>Note:</div>															COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																								
															FUSTAIA																								
															SPECIE LEGNOSA							Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%					
							N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³																						
				rilievi attuali																																			
				ABETE ROSSO		VII												1.117	70,0%																				
				LARICE		VII													0,0%																				
				ABETE BIANCO		VII													0,0%																				
				PINO SILVESTRE		VII													0,0%																				
				FAGGIO		VII												319	20,0%																				
ALTRE LATIFOGLIE		VII												160	10,0%																								
TOTALI														1.596	100,0%																								
rilievi prec.																																							
ABETE ROSSO		0													0,0%																								
LARICE		0													0,0%																								
ABETE BIANCO		0													0,0%																								
PINO SILVESTRE		0													0,0%																								
FAGGIO		0													0,0%																								
ALTRE LATIFOGLIE		0													0,0%																								
TOTALI															0,0%																								
C																																							
E	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																										
							ad ha		totale																														
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Sp. Secondarie																					
					U	2012	B	45	0,9			144	36	766	192	4,0	21,3	35		3	2	5	40	15															
O	1988	9	45,0	0,7									80					20																					



DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <div>Ach</div>	PARTICELLA <div>N°</div>				16
	PIANO DEI TAGLI <div>1.Taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto, con rilascio minimo di 260-280 matricine ad ettaro .</div>	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità		2	
			codice intervento		141/171	
Volume cormometrico lordo			m³	140		
Anno o periodo di intervento			III			
Ceduo			accessibilità		2	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica			ha	05.32.00		
Volume dendrometrico		m³	306			
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
	141/171	N.U.	2	ha	4	
OSSERVAZIONI						

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <div>Ach</div>	PARTICELLA <div>N°</div>				17
	PIANO DEI TAGLI <div>1.Taglio successivo a gruppi in assistenza ai nuclei di rinnovazione presente.</div>	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		2
cod. trattamento				122		
Volume cormometrico lordc			m³	380		
Volume cormometrico			m³/ha	43		
Volume netto presunto			m³	260		
Tasso di utilizzazione			%	15%		
Anno o periodo di intervento			II			
Massa intercalare			accessibilità		1	
			codice intervento		141/171	
Volume cormometrico lordc			m³	120		
Anno o periodo di intervento			III			
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico			m³			
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
	141/171	N.U.	1	ha	3	
OSSERVAZIONI						

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <div>Smerse dell'albera</div>	PARTICELLA <div>N°</div>				18
	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio successivo a gruppi in assistenza ai nuclei di rinnovazione presente. 2. Taglio di conversione all'alto fusto per matricinatura intensiva (> 200 allievi ha).	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		1
cod. trattamento				122		
Volume cormometrico lordc			m³	200		
Volume cormometrico			m³/ha	19		
Volume netto presunto			m³	140		
Tasso di utilizzazione			%	10%		
Anno o periodo di intervento			II			
Massa intercalare			accessibilità		1	
			codice intervento		171	
Volume cormometrico lordc			m³	200		
Anno o periodo di intervento			II			
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico			m³			
Anno intervento						
OSSERVAZIONI			PIANO DELLE MIGLIORIE  1. Taglio di conversione alla fustaia mediante l'utilizzazione del ceduo di faggio con rilascio minimo di 200-300 matricine ettaro.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.
	171	P.U.		1	ha	4

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Smerse dell'albera</b>		PARTICELLA N°				19
	PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE				
Altitudine m s.l.m.: min. 900 max. 1.100 prevalente 1.000 Giacitura: medio versante Esposizione: Ovest  Terreno ripido. Accidentalità elevata per salti rocciosi e pietrosità diffusa. Matrice pedogenetica di tipo calcareo. Humus di tipo moder. Suolo profondo, fresco, dotato di buona sostanza organica nella fascia alta sotto strada; nella parte medio-bassa suolo tendenzialmente superficiale con scarsa freschezza. Faggeta montana dei substrati carbonatici, composta da faggio (55%), abete rosso (35%), acero di monte, carpino nero, orniello, pioppo tremolo, nocciolo (10%). Ceduo composto invecchiato di faggio, carpino nero, acero di buon sviluppo nella porzione superiore a maggior bilancio idrotrofico, con maestosi esemplari di origine gamica lungo la strada Mazzunno-Prave. Presenza di fustaia di abete rosso a gruppi o singoli esemplari irregolarmente distribuita sulla particella. Nel complesso distribuzione verticale monoplana. Buona copertura. Rinnovazione di abete rosso e faggio sotto copertura. Strato arbustivo: faggio, carpino nero. Strato erbaceo: Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea, Dentaria enneaphyllos, Pulmonaria officinalis e felci.	1.Taglio successivo a gruppi in assistenza ai nuclei di rinnovazione presente. 2. Taglio di conversione all'alto fusto per matricinatura intensiva (> 200 allievi ha).		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		1
					cod. trattamento		122
				Volume cormometrico lordo m³			130
				Volume cormometrico m³/ha			12
				Volume netto presunto m³			90
				Tasso di utilizzazione %			8%
				Anno o periodo di intervento			II
				Massa intercalare	accessibilità		1
					codice intervento		171
				Volume cormometrico lordo m³			200
				Anno o periodo di intervento			I
				Ceduo	accessibilità		
					cod. trattamento		
				Ripresa planimetrica ha			
				Volume dendrometrico m³			
				Anno intervento			
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE		Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
	1. Taglio di conversione alla fustaia mediante l'utilizzazione del ceduo di faggio con rilascio minimo di 200-300 matricine ettaro.		171	U.	1	ha	4

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																			
N° PART.	LOCALITA'			F U S T A I A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO														
20	Smerse dell'albera								BASIMETRICA m²							normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³		%										
CLASSE COLTURALE			ceduo						ad ha	Totale							ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale									
CLASSE ATTITUDINALE			produzione																														
CLASSE ECONOMICA			O																														
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:									2012	VII						75	0,1				25				208	5	61	0,1	0,8	0,1	0,6	1,0%	
Orno-ostrieto tipico																																	
SUPERFICIE TOTALE LORDA		12.16.19																															
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.06.19																															
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.0																															
SUP. PROD. FORESTALE		12.10.00																															
Notizie piano precedente																																	
Superficie produttiva ha		10.20.00																															
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate																														
FUSTAIA m³		0	0																														
CEDUO m³		5.000	2.000																														
Classi di accessibilità ha				I II III	03.24.87 05.69.81 03.21.51																												
Note:																																	
.																																	
C E D U O																																	
Anno rilievi																																	
Fertilità																																	
Età media (anni)																																	
Densità media																																	
Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																									
ad ha		totale				ad ha		totale																									
ad ha		Totale		ceduo		matricine		ad ha		Totale		Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Sp. Secondarie																
2012		M		55		1,0		36,0		413,8		150		50		1.724		575		3,6		41,8		65						5		30	
1988		9		45,0		0,7																80								20			



DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <div>Smerse dell'albera</div>	PARTICELLA <div>N°</div>				20
	PIANO DEI TAGLI <div>1.Taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto, con rilascio minimo di 260-280 matricine ad ettaro .</div>	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc <div>m³</div>						
Volume cormometrico <div>m³/ha</div>						
Volume netto presunto <div>m³</div>						
Tasso di utilizzazione <div>%</div>						
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc <div>m³</div>						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica <div>ha</div>			06.05.00			
Volume dendrometrico <div>m³</div>			920			
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE			Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura
OSSERVAZIONI						

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																		
N° PART.	LOCALITA'			F U S T A I A	Anno rilevi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO													
21	Smerse dell'albera								BASIMETRICA m²							normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³		%									
CLASSE COLTURALE			ceduo						ad ha	Totale							ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale								
CLASSE ATTITUDINALE			produzione																													
CLASSE ECONOMICA			O						2012	IX						75					0				0	0	0					0,0%
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:  Orno-ostrieto tipico									1988	0							0,0				0		0,0		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
SUPERFICIE TOTALE LORDA									13.58.17	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																						
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA									0.08.17	FUSTAIA																						
SUP. PROD. NON FORESTALE									0.0.0	SPECIE LEGNOSA						Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%				
SUP. PROD. FORESTALE									13.50.00								N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³					
Notizie piano precedente																																
Superficie produttiva ha									10.00.00																							
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate																													
FUSTAIA m³		0	0																													
CEDUO m³		5.000																														
Classi di accessibilità ha				I	02.01.06																											
				II	07.01.12																											
				III	04.55.99																											
Note:																																
C E D U O	Anno rilevi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																			
	2012	M	50	1,0	25,0	337,5	ad ha		totale		ad ha	Totale																				
							ceduo	matricine	ceduo	matricine			Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Sp. Secondarie														
							ad ha	Totale	ceduo	matricine			ad ha	Totale																		
	1988	9	45,0	0,7									80		15			5														

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Smerse dell'albera</b>	PARTICELLA N°				<b>21</b>
	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto, con rilascio minimo di 260-280 matricine ad ettaro .	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica			ha	<b>09.45.00</b>		
Volume dendrometrico		m³	<b>1.512</b>			
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

## Frazionisti di Mazzunno

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

**PROPRIETA':** Frazionisti di Mazzunno

N° PART.		LOCALITA'	
22		Dos	
CLASSE COLTURALE		ceduo	
CLASSE ATTITUDINALE		produzione	
CLASSE ECONOMICA		O	
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:			
Orno-ostrieto tipico			
SUPERFICIE TOTALE LORDA		11.01.92	
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.01.92	
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.0	
SUP. PROD. FORESTALE		11.00.00	
Notizie piano precedente			
Superficie produttiva ha		09.30.00	
UTILIZZAZIONI	Previste	Effettuate	
FUSTAIA m³	0	0	
CEDUO m³	1.500		
Note:			
.			

Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO					%							
				normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³													
				ad ha	ad ha						Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale											
2012	IX	85					0				0	0	0					0,0%								
1988	0		0,0				0		0,0		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0								
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																										
FUSTAIA																										
SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%												
			N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³													
ABETE ROSSO		IX														0,0%										
			LARICE		IX												0,0%									
						ABETE BIANCO		IX											0,0%							
									PINO SILVESTRE		IX											0,0%				
												FAGGIO		IX											0,0%	
															ALTRE LATIFOGIE		IX									
TOTALI																										0,0%
rilievi prec.	ABETE ROSSO		0																				0,0%			
				LARICE		0																0,0%				
							ABETE BIANCO		0													0,0%				
										PINO SILVESTRE		0											0,0%			
													FAGGIO		0											0,0%
																ALTRE LATIFOGIE		0								
	TOTALI																									

C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %						
							ad ha		totale										
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Sp. Secondarie	
	2012	M	50	1,0	46,0	506,0	144	36	1.584	396	3,6	39,6	70					30	
	1988	9	45,0	0,7									80					20	

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Dos		PARTICELLA N°		22
	PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità
Altitudine m s.l.m.: min. 650 max. 950 prevalente 800  Giacitura: basso-medio versante Esposizione: Sud-ovest  Terreno ripido. Accidentalità elevata per rocciosità e pietrosità diffusa. Matrice pedogenetica di tipo calcareo. Humus di tipo moder. Suolo sufficientemente profondo, di discreta freschezza e sostanza organica. Orno-ostrieto tipico dei substrati calcarei, composto da carpino nero (70%) ed altre latifoglie (30%) quali: nocciolo, orniello, frassino maggiore, faggio, ciliegio selvatico, roverella, castagno, pioppo tremolo, farinaccio. Ceduo matricinato con distribuzione verticale monoplana. Buona copertura. Rinnovazione di carpino nero, orniello, nocciolo e abete rosso sotto copertura. Buono stato fitosanitario;conformazione dei fusti inarcata verso valle. Strato arbustivo: edera, nocciolo, carpino nero, tasso, rovo. Strato erbaceo: graminacee, Vinca minor, Hepatica nobilis, Helleborus niger, Cyclamen purpurascens.					
		cod. trattamento			
		Volume cormometrico lordc m³			
		Volume cormometrico m³/ha			
		Volume netto presunto m³			
		Tasso di utilizzazione %			
		Anno o periodo di intervento			
		Massa intercalare		accessibilità	
				codice intervento	
		Volume cormometrico lordc m³			
		Anno o periodo di intervento			
		Ceduo		accessibilità	2
				cod. trattamento	155
Ripresa planimetrica ha		07.70.00			
Volume dendrometrico m³		1.109			
Anno intervento					
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
OSSERVAZIONI					

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																
N° PART.	LOCALITA'			F	U	S	T	A	I	A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO					
23	Plaiò														BASIMETRICA m²							normale m³		reale m³		medio m³		corrente m³		%
CLASSE COLTURALE		ceduo													ad ha	Totale						ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	
CLASSE ATTITUDINALE		produzione																												
CLASSE ECONOMICA		O																												
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:																														
Orno-ostrieto tipico																														
SUPERFICIE TOTALE LORDA		07.02.53																												
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.02.53																												
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.0																												
SUP. PROD. FORESTALE		07.00.00																												
Notizie piano precedente																														
Superficie produttiva ha		05.80.00																												
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate																											
FUSTAIA m³		0	0																											
CEDUO m³		3.000	1.500																											
Note:																														

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Plaiò</b>		PARTICELLA N°		<b>23</b>
	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto, con rilascio minimo di 260-280 matricine ad ettaro .		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità
Altitudine m s.l.m.: min. 920      max. 1.100      prevalente 1.010  Giacitura:              medio versante              Esposizione: Sud-ovest   Terreno ripido. Accidentalità elevata per rocciosità e pietrosità diffusa. Matrice pedogenetica di tipo calcareo. Humus di tipo moder. Suolo mediamente profondo, scarsa freschezza. Orno-ostrieto tipico dei substrati calcarei, composto da carpino nero (80%), orniello, faggio, farinaccio, maggiociondolo, abete rosso (20%). Ceduo invecchiato di carpino nero,orniello,faggio, nella parte alta della particella. Distribuzione verticale monoplana. Buona copertura. Rinnovazione di carpino nero, orniello. Strato arbustivo: carpino nero, rovo. Strato erbaceo: ericacee, graminacee, Polygala chamaebuxus, Vinca minor, Hepatica nobilis, Helleborus niger, Cyclamen purpurascens.					
		cod. trattamento			
		Volume cormometrico lordc      m³			
		Volume cormometrico      m³/ha			
		Volume netto presunto      m³			
		Tasso di utilizzazione      %			
		Anno o periodo di intervento			
		Massa intercalare		accessibilità	
				codice intervento	
		Volume cormometrico lordc      m³			
		Anno o periodo di intervento			
		Ceduo		accessibilità	3
				cod. trattamento	155
		Ripresa planimetrica      ha		<b>04.90.00</b>	
		Volume dendrometrico      m³		<b>635</b>	
		Anno intervento			
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
OSSERVAZIONI					

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																															
N° PART.	LOCALITA'			F U S T A I A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO																										
24	Plaiò								BASIMETRICA m²							normale m³		reale m³		medio m³		corrente m³		%																					
CLASSE COLTURALE		ceduo							ad ha	Totale						ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale																							
CLASSE ATTITUDINALE		produzione																																											
CLASSE ECONOMICA		O							2012	VIII						95	0,2				23				176	5	81	0,1	0,9	0,1	0,8	1,0%													
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:  Orno-ostrieto tipico									1988	0							0,0				0		0,0		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0													
SUPERFICIE TOTALE LORDA		16.25.99							COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																				
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.05.99																																											
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.0							FUSTAIA																																				
SUP. PROD. FORESTALE		16.20.00																																											
Notizie piano precedente									SPECIE LEGNOSA																		Tariffa		Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%					
Superficie produttiva ha		10.00.00																									N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°		m³				
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate						ABETE ROSSO																		VIII											81	100,0%						
FUSTAIA m³		0	0																								VIII											81		100,0%					
CEDUO m³		1.500							ABETE BIANCO																		VIII												0,0%						
																											VIII													0,0%					
Classi di accessibilità ha		I	0.0.06						PINO SILVESTRE																		VIII												0,0%						
		II	07.75.19																								VIII													0,0%					
		III	08.50.73																								VIII													0,0%					
Note: .									FAGGIO																		VIII												0,0%						
				VIII																															0,0%										
				VIII																															0,0%										
				VIII																															0,0%										
				VIII																															0,0%										
				VIII																															0,0%										
				ALTRE LATIFOGIE																		VIII												0,0%											
TOTALI																																	81	100,0%											
				rilievi prec.																		0															0,0%								
ABETE ROSSO		0																															0,0%												
LARICE		0																															0,0%												
ABETE BIANCO		0																															0,0%												
PINO SILVESTRE		0																															0,0%												
FAGGIO		0																															0,0%												
				TOTALI																		0												0,0%											
TOTALI																																		0,0%											
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																																
					ad ha	Totale	ad ha		totale		ad ha	Totale																																	
							ceduo	matricine	ceduo	matricine			Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Sp. Secondarie																											
					U	2012	S	40	0,7			144	16	1.866	207	4,0	51,8	65					20	15																					
O	1988	9	45,0	0,7									80					20																											



DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Plaiò</b>		PARTICELLA N°		<b>24</b>		
	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio raso matricinato dell'orno-ostrieto, con rilascio minimo di 260-280 matricine ad ettaro .		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
Altitudine m s.l.m.: min. 750      max. 1.000      prevalente 900  Giacitura:              medio versante              Esposizione: Ovest   Terreno molto ripido. Accidentalità elevata per rocciosità e pietrosità diffusa. Matrice pedogenetica di tipo calcareo. Humus di tipo moder. Suolo sufficientemente profondo, di scarsa freschezza. Orno-ostrieto tipico dei substrati calcarei, composto da carpino nero (65%), orniello, frassino maggiore, acero di monte, faggio, farinaccio, maggiociondolo, abete rosso (35%). Ceduo invecchiato di carpino nero,orniello,faggio, nella parte alta della particella. Nella parte bassa ceduo giovane per passate utilizzazioni. Distribuzione verticale monoplana. Buona copertura. Rinnovazione di carpino nero, orniello. Strato arbustivo: carpino nero, rovo. Strato erbaceo: graminacee, Vinca minor, Hepatica nobilis, Helleborus niger, Cyclamen purpurascens.							
		cod. trattamento					
		Volume cormometrico lordc      m³					
		Volume cormometrico      m³/ha					
		Volume netto presunto      m³					
		Tasso di utilizzazione      %					
		Anno o periodo di intervento					
		Massa intercalare		accessibilità			
				codice intervento			
		Volume cormometrico lordc      m³					
		Anno o periodo di intervento					
		Ceduo		accessibilità	3		
				cod. trattamento	155		
		Ripresa planimetrica      ha		<b>08.10.00</b>			
		Volume dendrometrico      m³		<b>829</b>			
Anno intervento							
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE		Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

Frazionisti di Mazzunno			DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																																													
N° PART.	LOCALITA'		F U S T A I A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO																																								
25	Plaio							BASIMETRICA m²							normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³		%																																				
CLASSE COLTURALE		fustaia						ad ha	Totale							ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale																																			
CLASSE ATTITUDINALE		produzione																																																								
CLASSE ECONOMICA		E																																																								
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:  Aceri-frassineto tipico			F U S T A I A	2012	VIII	65	0,7				23				176	70	1645	1,1	25,3	1,1	26,3	1,6%																																				
1988	0																						0,0				0		0,0		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0																				
																																							COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																			
																																							FUSTAIA																			
																																							SPECIE LEGNOSA	Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%						
																																									N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³							
																																							ABETE ROSSO		VIII															494	30,0%	
																																							LARICE		VIII																0,0%	
																																							ABETE BIANCO		VIII																0,0%	
																																							PINO SILVESTRE		VIII																0,0%	
																																							FAGGIO		VIII																0,0%	
																																							ALTRE LATIFOGLIE		VIII															1.152	70,0%	
																																							TOTALI																	1.645	100,0%	
																																							rilievi prec.	ABETE ROSSO		0																0,0%
																																								LARICE		0																0,0%
			ABETE BIANCO		0																0,0%																																					
PINO SILVESTRE		0																0,0%																																								
FAGGIO		0																0,0%																																								
ALTRE LATIFOGLIE		0																0,0%																																								
TOTALI																		0,0%																																								
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																																													
							ad ha		totale																																																	
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Sp. Secondarie																																								
					2012	M	45	0,8			180		2.538		4,0	56,4	70				5	20	5																																			
O	1988	9	45,0	0,7									80					20																																								

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Plaiò</b>		PARTICELLA N°		<b>25</b>
	Altitudine m s.l.m.: min. 590      max. 1.050      prevalente 800  Giacitura:      basso-medio versante      Esposizione: Ovest   				

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																								
N° PART.	LOCALITA'			F	U	S	T	A	I	A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO													
26	Plaiò														BASIMETRICA m²							normale m³		reale m³		medio m³		corrente m³		%								
CLASSE COLTURALE		ceduo													ad ha	Totale						ad ha	ad ha	Totale	ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale									
CLASSE ATTITUDINALE		protezione																																				
CLASSE ECONOMICA		Y													2012	IX						60	0,1				19				120	8	40	0,1	0,7	0,1	0,4	1,0%
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:  Orno-ostrieto primitivo di rupe															1988	0							0,0				0			0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
SUPERFICIE TOTALE LORDA 05.31.93 SUPERFICIE IMPRODUTTIVA 0.31.93 SUP. PROD. NON FORESTALE 0.0.0 SUP. PROD. FORESTALE 05.00.00  Notizie piano precedente Superficie produttiva ha 02.00.00 UTILIZZAZIONI Previste Effettuate FUSTAIA m³ 0 0 CEDUO m³  Classi di accessibilità ha I 01.25.16 II 03.82.13 III 0.24.64  Note: .															COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																							
															FUSTAIA																							
															SPECIE LEGNOSA							Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%				
																							N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³					
															ABETE ROSSO							IX															40	100,0%
															LARICE							IX																0,0%
															ABETE BIANCO							IX																0,0%
															PINO SILVESTRE							IX																0,0%
															FAGGIO							IX																0,0%
ALTRE LATIFOGLIE		IX																																0,0%				
TOTALI																		40	100,0%																			
rilievi prec.		ABETE ROSSO		0															0,0%																			
		LARICE		0															0,0%																			
		ABETE BIANCO		0															0,0%																			
		PINO SILVESTRE		0															0,0%																			
		FAGGIO		0															0,0%																			
		ALTRE LATIFOGLIE		0															0,0%																			
		TOTALI																		0,0%																		
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																									
							ad ha		totale																													
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Sp. Secondarie																				
					2012	S	40	0,6			90		270		2,3	6,8	80					10	10															
1988	9											80					20																					

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Plaiò</b>	PARTICELLA N°				<b>26</b>
	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio raso matricinato della parte inferiore verso la Via Mala, con rilascio minimo di 70 matricine ad ettaro.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica			ha	<b>02.00.00</b>		
Volume dendrometrico			m³	<b>86</b>		
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

Frazionisti di Mazzunno				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Frazionisti di Mazzunno																			
N° PART.	LOCALITA'			F  U  S  T  A  I  A	Anno  rilievi	Fertilità	Età  media (anni)	Densità  media	AREA		Altezza  media	Statura	Diametro  medio	Volume  pianta  media	N°  piante  ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO														
27	Dezzo								BASIMETRICA  m²							normale  m³	reale  m³		medio  m³		corrente  m³		%										
CLASSE COLTURALE		ceduo							ad ha	Totale							ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale									
CLASSE ATTITUDINALE		protezione																															
CLASSE ECONOMICA		Y							2012	IX						50	0,1				19				120	10	50	0,2	1,0	0,1	0,6	1,2%	
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:  Orno-ostrieto primitivo di rupe									1988	0							0,0				0		0,0		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
SUPERFICIE TOTALE LORDA		06.09.68							COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																								
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		01.09.68							FUSTAIA																								
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.0							rilievi  attuali	SPECIE LEGNOSA						Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%					
SUP. PROD. FORESTALE		05.00.00															N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³						
Notizie piano precedente																																	
Superficie produttiva ha		03.00.00																															
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate																														
FUSTAIA m³		0	0																														
CEDUO m³																																	
Classi di accessibilità ha		I	03.86.45																														
		II	02.23.23																														
		III	0.0.0																														
Note: .																																	
C	Anno  rilievi	Fertilità	Età  media (anni)						Densità  media	Area basimetrica m²						Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %											
E										ad ha						Totale	ad ha		totale		ad ha	Totale											
D																	ad ha	Totale	ceduo	matricine									ceduo	matricine			
U										2012						S	45	0,4			80		400		1,8	8,9	90						10
O										1988						9											80						20

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Dezzo</b>		PARTICELLA N°				27
Altitudine m s.l.m.: min. 550 max. 650 prevalente 600 Giacitura: basso versante Esposizione: Ovest  Terreno scosceso. Accidentalità elevata per salti rocciosi e pietrosità diffusa. Matrice pedogenetica di tipo calcareo. Suolo rendzina, superficiale, fresco. Orno-ostrieto primitivo di rupe, composto da carpino nero (90%), orniello, farinaccio, acero (10%). Ceduo invecchiato caratterizzato da scarsa statura e accrescimenti, a causa dei continui affioramenti rocciosi. Distribuzione verticale monoplana.Copertura lacunosa nei pressi dei salti. Rinnovazione di abete rosso sporadica sul fondovalle della forra del Dezzo della particella. Strato arbustivo: orniello, carpino nero, tasso. Strato erbaceo: ericacee, graminacee.	PIANO DEI TAGLI  1.Taglio raso matricinato della parte inferiore verso la Via Mala, con rilascio minimo di 70 matricine ad ettaro.		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
					cod. trattamento		
				Volume cormometrico lordc m³			
				Volume cormometrico m³/ha			
				Volume netto presunto m³			
				Tasso di utilizzazione %			
				Anno o periodo di intervento			
				Massa intercalare	accessibilità		
					codice intervento		
				Volume cormometrico lordc m³			
				Anno o periodo di intervento			
				Ceduo	accessibilità		1
					cod. trattamento		155
				Ripresa planimetrica ha			02.00.00
				Volume dendrometrico m³			128
				Anno intervento			
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE		Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità