



DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <b>Sossè alto</b>		PARTICELLA N°				27
	Altitudine m s.l.m.: min. 1.460 max. 1.710 prevalente  Giacitura: Basso versante Esposizione: Nord - Ovest  Altitudine: da 1.460 a 1.710 m s.l.m. – Esposizione: Nord-Ovest Inclinazione: molto ripido, a tratti scosceso. Giacitura: basso versante. Substrato geologico: Paragneiss a sillimanite. Tipo di suolo: Podzol. Terreno: mediamente superficiale e pietroso, fresco, con rocciosità affiorante localizzata, soprattutto nella parte bassa. Roccia micascisti e filladi. Copertura viva: sottobosco pressoché assente, costituito da graminacee, muschi e felci, Oxalis acetosella, Fragaria vesca, Achillea millefolium, Vaccinium myrtillus, Rhododendron ferrugineum. Copertura morta: presenza di sostanza organica indecomposta e necromassa al suolo, localizzata, costituita soprattutto da rami secchi e schianti, anche in decomposizione. Soprassuolo: Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici, costituito in prevalenza da abete rosso, accompagnato dal larice. Struttura paracoetanea per gruppi, monoplana, copertura colma e densità eccessiva, soprattutto nella parte alta. Il soprassuolo appare eccessivamente chiuso, gli individui presentano molti rami morti inseriti in basso, nella porzione Ovest presentano anche scarsa biomassa fogliare e chiome ridotte. Nella parte bassa il soprassuolo è meno denso, su substrato più superficiale e pietroso. Nella parte alta, verso Sud, la situazione tende a migliorare (densità e portamento), ma permangono zone eccessivamente chiuse e sono presenti numerosi schianti. Nella porzione verso rio Vallicella, è presente il larice, anche in rinnovazione, accompagnato da arbusti quali Alnus viridis e Salix caprea, oltre a graminoidi, Adenostyles alliariae sp., felci e muschio. Sporadica presenza di Populus tremula e Salix caprea. Rinnovazione: stentata, a gruppi, nelle chiarie.		PIANO DEI TAGLI  1. Nella porzione medio-inferiore della particella taglio raso a buche (800-1.200 mq) finalizzato ad interrompere la continuità del soprassuolo e creare condizioni idonee all'insediamento della rinnovazione. 2. Taglio di sgombero del soprassuolo in corrispondenza degli impluvio presente al confine Nord della particella accompagnato da taglio di preparazione sui soprassuoli di margine. 3. Al bordo della strada statale e della Tonalina, taglio per piede d'albero del soprassuolo adulto e maturo, con rilascio dei soggetti migliori, con finalità estetico-paesaggistica e turistico-ricreativa (miglioramento dei caratteri estetici e della fruibilità del bosco).		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità
cod. trattamento	103-114						
Volume cormometrico lordo m³		960					
Volume cormometrico m³/ha		66					
Volume netto presunto m³		770					
Tasso di utilizzazione %		16%					
Anno o periodo di intervento		I					
Massa intercalare	accessibilità	1					
	codice intervento	131-132-141					
Volume cormometrico lordo m³		240					
Anno o periodo di intervento		I					
Ceduo	accessibilità						
	cod. trattamento						
Ripresa planimetrica ha							
Volume dendrometrico m³							
Anno intervento							
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE  1. Diradamento selettivo volto a ridurre la densità al fine di consentire la rinnovazione e favorirla laddove presente. 2. Taglio fitosanitario di piante deperienti, morte in piedi e con cimale spezzato. 3. Allontanamento di piante schiantate.		Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
	131-132-141	I	1	ha	12		